

THD operatie voor aambeien



Dr DERUYTER LIEVEN

Uitleg over de THD operatie bij aambeien en
de verzorging na de operatie.

HP


AZ SINT-JANBRUGGE-OOSTENDE AV

CAMPUS HENRI SERRUYS

THD operatie bij aambeien.


Aambeien zijn opgezwollen en uitgezakte zwellichaampjes thv de aars. De voornaamste klachten zijn jeuk en irritatie thv de aars, bloedverlies op het einde van de ontlasting, aanwezigheid van knobbels thv aars.

De THD behandeling wordt toegepast bij aambeien graad II en III, waar de conservatieve en medische behandeling geen beterschap brachten.



Aambeien graad II


Vergrote aambeien die bij persen uit de aars zakken en vanzelf weer terugkeren




Aambeien graad III

Sterk vergrote aambeien die met de vinger moeten teruggeduwd worden

Bij de THD behandeling wordt een speciale proctoscoop (kijkbuisje) in de aars gebracht. De THD proctoscoop bevat een Dopplersonde om de kleine slagadertjes die naar de aambeien lopen via een geluidssignaal op te sporen. Na de nauwkeurige lokalisatie wordt het bloedvatje afgebonden met een hechting. In totaal worden 5 tot 6 slagadertjes afgebonden. De aambeien krijgen geen vers bloed meer en verschrompelen na enkele weken.




THD ligatuur




Verschrompeling van de aambeien na THD ligatuur

Bij uitzakkende aambeien (graad III) wordt eerst het aanvoerende slagadertje laag in de endeldarm gelokaliseerd mbv de Dopplersonde en nadien afgebonden. Vervolgens wordt de uitgezakte aambeï met een doorlopende hechting omhoog getrokken in het anaal kanaal (hemorroïdopexie).



Hemorroïdopexie met optrekken van uitgezakte aambeien in de aars



verschrompeling van de uitgezakte aambeien

De THD operatie wordt onder algemene anesthesie uitgevoerd in dagkliniek. Een speciale darmvoorbereiding is niet nodig. Een klein lavementje (Fleet° enema) wordt toegediend de ochtend van de operatie. Dit kan thuis gebeuren of in de dagkliniek.

De ingreep duurt ongeveer 30 minuten. Op het einde van de THD operatie wordt een anale tampon ingebracht (Spongostan°) die vanzelf zal oplossen of bij de eerste ontlasting naar buiten zal komen.

Na de operatie kan het soms moeilijk zijn om te plassen (**urineretentie**). De verpleegkundige van de dagkliniek zal de blaasinhoud controleren met een bladderscanner. Soms is het noodzakelijk een sonde in de blaas te brengen. De urineretentie is een tijdelijk fenomeen dat snel verdwijnt. Een korte hospitalisatie (één nacht) is soms noodzakelijk.

Bij ontslag wordt medicatie meegegeven: een stoelgangverzachter (Movicol° siroop 1 maatje s' morgens op te lossen in een groot glas plat water of fruitsap), een pijnstillers (Paracetamol 1 gr tot 4maal per dag), Daflon° 500 mg 3x2

tabletten per dag) en Naprosyne° EC 2x 500 mg/d als behandeling van de postoperatieve zwelling van de aars.

U mag een telefoontje verwachten van de verpleegkundige van de dagkliniek op de eerste dag na de operatie of op maandag wanneer u vrijdag werd geopereerd.

Het werk en de normale bezigheden kunnen na één week hernomen worden. Het is wel aangeraden geen extreme lichamelijke inspanningen te doen gedurende de eerste week na de operatie.

De mogelijke bijwerkingen na de THD operatie zijn **pijn** (kloppend of drukkend anaal gevoel). Deze pijnklachten verminderen en verdwijnen na enkele dagen. Bij toenemende pijnklachten moet de arts gecontacteerd worden.

Bij de ontlasting kan wat **bloedverlies** voorkomen. Hierover moet je niet ongerust zijn. Bij hevig bloedverlies tijdens of buiten de ontlasting moet de arts verwittigd worden.

Soms gebeurt het dat de ontlasting pijnlijk is. Neem daarom je stoelgangverzachter elke ochtend bij het ontbijt. Wanneer de ontlasting onmogelijk is wegens te pijnlijk of te hard dient de arts te worden gecontacteerd.

Bij **koorts** dient steeds de arts te worden geraadpleegd!

Een controle raadpleging na een THD procedure wordt voorzien na één week.

Vragen of problemen na THD operatie:

- Dagkliniek AZ Sint Jan Oostende: 059/555131 (van 08 tot 19 uur, niet in weekend)
- Dr Deruyter Lieven : 059/555225 (van 08 tot 17 uur, niet in weekend)
059/555111 (van 08 uur tot 20 uur, elke dag)
- Dienst spoedgevallen AZ Sint Jan Oostende(bij ernstige klachten):
059/555101 (24h, elke dag van de week)